

۲. مختصر سوالات

۱. پیریاڈک ٹیبل میں ایلیمینٹس کو ترتیب دینے کے لیے اٹامک نمبر کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟

جواب: اٹامک نمبر نیوکلیس میں موجود پروٹونز کی تعداد ہے جو ہر ایلیمینٹ کے لیے مقرر اور منفرد ہوتی ہے اور یہی الیکٹرونز کی تعداد اور اس طرح ایٹم کی الیکٹرک کنفیگریشن کا تعین کرتی ہے۔ جب ایلیمینٹس کو بائیں سے دائیں ان کے اٹامک نمبرز کی صعودی ترتیب میں رکھا جاتا ہے تو ان کی الیکٹرک کنفیگریشنز باقاعدہ انداز میں بدلتی ہیں اور ان کی خصوصیات مقررہ وقفوں کے بعد دہرائی جاتی ہیں۔ اس سے ایسی ٹیبل بنتی ہے جس میں یکساں خصوصیات والے ایلیمینٹس ایک ہی عمودی کالم میں آ جاتے ہیں۔ مینڈلیف نے ایلیمینٹس کو ان کے اٹامک ماسز کے مطابق ترتیب دیا تھا، مگر بعد میں موزلے نے دکھایا کہ اٹامک نمبر کے مطابق ترتیب دینے سے بے قاعدگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے جدید پیریاڈک ٹیبل کی درست بنیاد اٹامک نمبر ہے۔

۲. لفظ پیریاڈک کی کیا اہمیت ہے؟

جواب: لفظ پیریاڈک کا مطلب ہے 'مقررہ وقفے کے بعد دہرایا جانا'۔ جدید پیریاڈک ٹیبل میں پیریڈ کے اندر بائیں سے دائیں جاتے ہوئے ایلیمینٹس کی الیکٹرک کنفیگریشن مسلسل بدلتی رہتی ہے، اس لیے ایک پیریڈ کے ایلیمینٹس اپنی خصوصیات میں بتدریج تبدیلی ظاہر کرتے ہیں۔ جب ایک شیل مکمل ہو جاتا ہے تو اگلے پیریڈ میں وہی بیرونی کنفیگریشن دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، اور یکساں بیرونی الیکٹرونز والے ایلیمینٹس ایک گروپ میں ایک دوسرے کے نیچے آ جاتے ہیں۔ چنانچہ مجموعی طور پر ٹیبل ایلیمینٹس کی خصوصیات کی مقررہ وقفوں کے بعد تکرار ظاہر کرتی ہے، اور اسی رجحان کو پیریائڈسیٹی کہا جاتا ہے — یہی لفظ پیریاڈک کی اہمیت ہے۔

۳. پیریاڈک ٹیبل میں جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو پیریڈز کا سائز بڑا کیوں ہوتا جاتا ہے؟

جواب: ہر پیریڈ ایک شیل کی تکمیل کی نمائندگی کرتا ہے، اور پیریڈ میں ایلیمینٹس کی تعداد اس بات سے مقرر ہوتی ہے کہ وہ شیل اور اس کے سب شیلز کتنے الیکٹرونز سما سکتے ہیں۔ پہلا پیریڈ صرف پہلا شیل بھرتا ہے اور اس میں 2 ایلیمینٹس ہیں۔ دوسرا اور تیسرا پیریڈ s اور p سب شیلز بھرتے ہیں اور ہر ایک میں 8 ایلیمینٹس ہیں۔ چوتھے پیریڈ سے d سب شیل بھی بھرنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے یہ پیریڈز لمبے ہوتے ہیں اور ہر ایک میں 18 ایلیمینٹس ہوتے ہیں۔ چھٹے اور ساتویں پیریڈ میں f سب شیل بھی بھرتا ہے، جس سے ہر ایک میں چودہ ایلیمینٹس کا سلسلہ شامل ہو جاتا ہے اور یہ بہت لمبے ہو کر 32، 32 ایلیمینٹس کے ہو جاتے ہیں۔ یعنی نیچے جاتے ہوئے پیریڈز صرف اس لیے بڑا ہوتا ہے کہ بھرنے کے لیے مزید سب شیلز دستیاب ہو جاتے ہیں۔

۴. گروپ میں موجود ایلیمینٹس کے بیرونی شیلز میں الیکٹرونز کی تعداد ایک جیسی کیوں ہے؟

جواب: پیریاڈک ٹیبل کے عمودی کالم گروپس کہلاتے ہیں، اور ٹیبل کو ایلیمینٹس کے اٹامک نمبرز کی بڑھتی ہوئی ترتیب سے اس طرح بنایا گیا ہے کہ الیکٹرک کنفیگریشن مقررہ وقفوں کے بعد دہرائی جائے۔ جب بھی ایک شیل مکمل ہوتا ہے تو نیا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے اور بیرونی شیل کا بھرنہ از سر نو شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اگلے پیریڈ میں اسی مقام پر آنے والے ایلیمینٹ کے بیرونی شیل میں الیکٹرونز کی تعداد اوپر والے ایلیمینٹ کے بالکل برابر ہوتی ہے، بس شیل اونچا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک گروپ کے تمام ایلیمینٹس کی بیرونی شیل کی کنفیگریشن ایک جیسی ہوتی ہے — مثلاً گروپ 1 کے لیے ns^1 اور گروپ 17 کے لیے ns^2np^5 — اور اسی لیے وہ یکساں کیمیائی خصوصیات ظاہر کرتے ہیں۔

۵. کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ کیلشیم سوڈیم کی نسبت زیادہ ری ایکٹو ہو گا؟ وضاحت کریں۔

جواب: نہیں، سوڈیم کیلشیم کی نسبت زیادہ ری ایکٹو ہے۔ سوڈیم گروپ 1 سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے بیرونی شیل میں صرف ایک الیکٹرون ہے جسے وہ بہت آسانی سے کھو کر Na^+ آئن بنا لیتا ہے؛ اس کی پہلی آئنائزیشن انرجی صرف $496 + kJ mol^{-1}$ ہے۔ کیلشیم گروپ 2 سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے بیرونی شیل میں دو الیکٹرونز ہیں، اور Ca^{2+} آئن بنانے کے لیے اسے دونوں کھونے پڑتے ہیں جس کے لیے کہیں زیادہ توانائی درکار ہے۔ مزید یہ کہ پیریڈ میں بائیں سے دائیں جاتے ہوئے نیوکلیئر چارج بڑھتا ہے اور ویلینس الیکٹرونز زیادہ مضبوطی سے جکڑے جاتے ہیں، اس لیے میٹلز کی کیمیائی ری ایکٹیویٹی بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ انہی دو وجوہات کی بنا پر کیلشیم سوڈیم سے کم ری ایکٹو ہے۔

۶. تیسرے پیریڈ میں کس ایلیمینٹ کا اٹامک ریڈیئس سب سے زیادہ ہو گا اور کس ایلیمینٹ کا سب سے کم؟

جواب: پیریڈ میں بائیں سے دائیں جاتے ہوئے ایٹمز کا سائز عام طور پر کم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ الیکٹرونز اسی بیرونی شیل میں شامل ہوتے رہتے ہیں جبکہ نیوکلیس پر چارج بڑھتا جاتا ہے اور یہ الیکٹرونز کو نیوکلیس کے قریب کھینچ لیتا ہے۔ تیسرا پیریڈ سوڈیم سے شروع ہو کر آرگن پر ختم ہوتا ہے۔ اس لیے پیریڈ کے پہلے ایلیمینٹ سوڈیم (Na) کا اٹامک ریڈیئس سب سے زیادہ اور آخری ایلیمینٹ آرگن (Ar) کا سب سے کم ہے۔ بانڈ بنانے والے ایلیمینٹس میں سے اس پیریڈ کا سب سے چھوٹا کوویلنٹ ریڈیئس کلورین کا ہے۔

۷. چھٹے اور ساتویں گروپس میں سب سے زیادہ الیکٹرو نیگیٹیو ایلیمینٹس کیوں موجود ہیں؟

جواب: الیکٹرونیگیٹیوٹی ایٹم کی الیکٹرون کھینچنے کی صلاحیت ہے، اور یہ پیریڈ میں بائیں سے دائیں بڑھتی ہے اور گروپ میں اوپر سے نیچے کم ہوتی ہے۔ آکسیجن فیملی اور ہیلوجن فیملی کے ایلیمینٹس ٹیبل کے دائیں جانب ہوتے ہیں اور اپنے پیریڈ کے سب سے چھوٹے ایٹمز ہیں، اس لیے ان کے نیوکلیریائی شیئر شدہ الیکٹران جوڑے کو بہت مضبوطی سے کھینچتے ہیں۔ نیز انہیں اپنا آکٹیٹ مکمل کرنے کے لیے بالترتیب صرف دو اور ایک الیکٹرون درکار ہوتا ہے، اس لیے ان میں الیکٹرونز اپنی طرف کھینچنے کا شدید رجحان ہوتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر سب سے زیادہ الیکٹرو نیگیٹیو ایٹمز — $F(4.0)$ ، $O(3.4)$ ، $N(3.0)$ اور $Cl(3.2)$ — اسی علاقے یعنی پیریڈک ٹیبل کے اوپر دائیں کونے میں پائے جاتے ہیں۔

۸۔ میگنیشم کے لیے پہلی آئنائزیشن انرجی کی ویلیو دوسری سے کم کیوں ہے؟

جواب: میگنیشم کے بیرونی شیل میں دو الیکٹرونز ہیں اور انہیں ایک ایک کر کے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ پہلا الیکٹرون ایک غیر جانبدار میگنیشم ایٹم سے نکالا جاتا ہے، جہاں پروٹونز اور الیکٹرونز کی تعداد برابر ہوتی ہے، اس لیے اس پر کشش نسبتاً کمزور ہوتی ہے اور صرف $+737 \text{ kJ mol}^{-1}$ درکار ہوتی ہے۔ اس الیکٹرون کے نکل جانے کے بعد پیچھے مثبت چارج والا Mg^{+} آئن رہ جاتا ہے جس میں اپنے الیکٹرونز کی تعداد سے ایک پروٹون زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے باقی ماندہ الیکٹرونز کو نیوکلئیس کہیں زیادہ مضبوطی سے جکڑے رکھتا ہے اور آئن کا سائز بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دوسرا الیکٹرون کھینچنے کے لیے کہیں زیادہ توانائی، $+1450 \text{ kJ mol}^{-1}$ ، درکار ہوتی ہے، اسی لیے دوسری آئنائزیشن انرجی ہمیشہ پہلی سے زیادہ ہوتی ہے۔

۹۔ کیا یہ دو میٹلز یا دو نان میٹلز کے لیے ممکن ہے کہ وہ آئیونک بانڈ بنائیں؟

جواب: نہیں۔ آئیونک بانڈ ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم کو ایک یا زیادہ الیکٹرونز کی منتقلی سے بنتا ہے، اس لیے دونوں ایٹمز میں سے ایک کو الیکٹرونز آسانی سے کھونے کے قابل اور دوسرے کو آسانی سے حاصل کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ میٹلز الیکٹرو پازیٹو ہوتے ہیں — ان کے بیرونی الیکٹرونز کم اور آئنائزیشن انرجی کم ہوتی ہے، اس لیے دونوں ہی الیکٹرونز کھونا چاہیں گے اور کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ نان میٹلز الیکٹرو نیگیٹیو ہوتے ہیں — دونوں ہی الیکٹرونز حاصل کرنا چاہیں گے اور کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہو گا۔ چنانچہ دو میٹلز میٹیلک بانڈ سے اور دو نان میٹلز کوویلنٹ بانڈ سے جڑتے ہیں جس میں الیکٹرونز شیئر ہوتے ہیں۔ آئیونک بانڈ صرف ایک میٹل اور ایک نان میٹل کے درمیان ہی بن سکتا ہے۔

۱۰۔ کس ایلیمینٹ کی آئنائزیشن انرجی کی ویلیو سب سے کم ہے اور کس ایلیمینٹ کی الیکٹرونیگیٹیوٹی کی ویلیو سب سے زیادہ ہے؟

جواب: آئنائزیشن انرجی گروپ میں اوپر سے نیچے اور پیریڈ میں دائیں سے بائیں جاتے ہوئے کم ہوتی ہے، اس لیے سب سے کم ویلیو اُس ایلیمینٹ کی ہو گی جو پیریڈک ٹیبل کے نیچے بائیں جانب ہو۔ باب میں دیے گئے پہلے گروپ کے ایلیمینٹس میں سے سیزیم کی آئنائزیشن انرجی سب سے کم یعنی 377 kJ mol^{-1} ہے۔ اس کے برعکس الیکٹرونیگیٹیوٹی پیریڈ میں بائیں سے دائیں بڑھتی اور گروپ میں نیچے کی طرف کم ہوتی ہے، اس لیے سب سے زیادہ ویلیو اوپر دائیں کونے والے ایلیمینٹ کی ہے: فلورین، جس کی الیکٹرونیگیٹیوٹی پالنگ اسکیل پر 4.0 ہے جو تمام ایلیمینٹس میں سب سے زیادہ ہے۔

۱۔ فرض کریں کہ ایک نیا ایلیمینٹ دریافت ہوتا ہے۔ آپ اس ایلیمینٹ کو پیریڈک ٹیبل میں کہاں رکھنا چاہیں گے؟

جواب: نئے ایلیمینٹ کو اس کے اٹامک نمبر اور الیکٹرانک کنفیگریشن کے مطابق رکھا جائے گا، کیونکہ جدید پیریڈک ٹیبل ایلیمینٹس کو اٹامک نمبر کی صعودی ترتیب میں رکھنے کا نام ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا اٹامک نمبر معلوم کریں گے اور اس کے ایٹم کی الیکٹرانک کنفیگریشن لکھیں گے۔ بھرے ہوئے شیلز کی تعداد پیریڈ بتاتی ہے، کیونکہ ہر پیریڈ ایک شیل کی تکمیل کی نمائندگی کرتا ہے۔ بیرونی شیل میں الیکٹرونز کی تعداد گروپ بتاتی ہے — ایک بیرونی الیکٹرون یعنی گروپ 1، دو یعنی گروپ 2، ns^2np^5 یعنی گروپ 17، وغیرہ جو سب شیل بھر رہا ہو وہ بلاک بتاتا ہے: s، p، d یا f۔ پھر ایلیمینٹ کو اسی پیریڈ اور گروپ میں رکھا جائے گا، جہاں اسے اپنے گروپ کے دوسرے ارکان جیسی خصوصیات ظاہر کرنی چاہئیں۔

۲۔ پیریڈک ٹیبل کا پہلا ایلیمینٹ کون سا ہے؟ کیا یہ الیکٹرون کھوتا ہے یا حاصل کرتا ہے؟

جواب: پیریڈک ٹیبل کا پہلا ایلیمینٹ ہائیڈروجن ہے جس کا اٹامک نمبر 1 ہے۔ اس کے پاس صرف ایک الیکٹرون ہے جو اس کے بیرونی (پہلے) شیل میں موجود ہے۔ گروپ 1 کے دوسرے ایلیمینٹس کی طرح اس میں بھی یہ واحد الیکٹرون کھو کر مثبت آئن H^+ بنانے کا شدید رجحان ہے، جو دراصل ایک پروٹون ہی ہے — یہی کچھ ہوتا ہے جب کوئی ایسڈ پانی میں تحلیل ہوتا ہے۔ تاہم ہائیڈروجن ایک خاص صورت ہے: اس کا شیل دو الیکٹرونز سے مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ ایک الیکٹرون حاصل کر کے اپنا ڈولٹ مکمل کرتے ہوئے ہائیڈرائڈ آئن H^- بھی بنا سکتا ہے۔ اس کا عام رویہ بہر حال الیکٹرون کھونے کا ہے۔

۳۔ بورون اور ایلومینیم کے اٹامک ریڈیئس بالترتیب 88 pm اور 125 pm ہیں۔ کون سا ایلیمینٹ الیکٹرون یا الیکٹرونز آسانی سے کھو دے گا؟

جواب: ایلومینیم اپنے الیکٹرونز زیادہ آسانی سے کھوئے گا۔ آئونائزیشن انرجی کا تعلق براہ راست اٹامک سائز سے ہے: ایٹم کا ریڈیئس جتنا چھوٹا ہو گا، نیوکلیس اور بیرونی الیکٹرونز کے درمیان کشش اتنی ہی مضبوط اور آئونائزیشن انرجی اتنی ہی زیادہ ہو گی۔ ایلومینیم، جس کا ریڈیئس 125 pm ہے، بورون (88 pm) کی نسبت بہت بڑا ایٹم ہے، اس لیے اس کے بیرونی الیکٹرونز نیوکلیس سے زیادہ دور ہیں اور اندرونی الیکٹرونز کی زیادہ تہوں سے ڈھکے ہوئے بھی ہیں۔ چنانچہ وہ ڈھیلے جکڑے ہوتے ہیں اور کم توانائی سے نکالے جا سکتے ہیں۔ اسی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایلومینیم بورون سے زیادہ میٹیلک اور زیادہ الیکٹرو پازیٹو ہے — یہی وجہ ہے کہ گروپ میں نیچے جاتے ہوئے میٹیلک کیریکٹر بڑھتا ہے۔

۴۔ آپ کسی ایٹم کا ریڈیئس کیسے معلوم کریں گے؟

جواب: ایٹم کے الیکٹران بادل کی کوئی متعین حد نہیں ہوتی، اس لیے تنہا ایٹم کے سائز کی بالکل درست تعریف نہیں کی جا سکتی۔ جو چیز ماپی جا سکتی ہے وہ ایٹم کا ریڈیئس ہے جب وہ اپنے ہی جیسے ایٹم کے ساتھ بندھا ہوا ہو۔ چنانچہ اٹامک ریڈیئس کی تعریف یہ ہے کہ یہ دو یکساں بندھے ہوئے ایٹمز کے نیوکلیائی کے درمیان فاصلے کا نصف ہے، اور اسے پیکو میٹر میں ظاہر کیا جاتا ہے (10^{-12} m)۔ مثلاً دو بندھے ہوئے کاربن ایٹمز کے نیوکلیائی کے درمیان فاصلہ 154 pm ہے، اس لیے اس فاصلے کا نصف یعنی 77 pm کاربن ایٹم کا ریڈیئس ہے۔ اسے ایٹم کا کوویلنٹ ریڈیئس بھی کہا جاتا ہے۔

۵۔ نائٹروجن تو تین الیکٹرونز جذب کر کے N^{3-} بنا دیتی ہے، آکسیجن ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟

جواب: کوئی ایٹم کتنے الیکٹرونز قبول کر سکتا ہے، اس کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ اسے اپنا آکٹیٹ مکمل کرنے کے لیے کتنے درکار ہیں۔ نائٹروجن گروپ 15 سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی کنفیگریشن ns^2np^3 ہے یعنی بیرونی شیل میں پانچ الیکٹرونز؛ اس لیے اسے آٹھ تک پہنچنے کے لیے بالکل تین مزید الیکٹرونز چاہئیں اور یہ N^{3-} بنا لیتی ہے۔ آکسیجن گروپ 16 سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی کنفیگریشن ns^2np^4 ہے یعنی بیرونی شیل میں چھ الیکٹرونز؛ اسے اپنا آکٹیٹ مکمل کرنے کے لیے صرف دو الیکٹرونز درکار ہیں اور یہ O^{2-} بناتی ہے۔ تیسرے الیکٹرون کے لیے اس شیل میں کوئی خالی جگہ باقی نہیں رہتی اور اسے نیوکلیس سے بہت دور ایک نئے شیل میں داخل ہونا پڑے گا، وہ بھی آئن پر پہلے سے موجود دو منفی چارجز کی مزاحمت کے خلاف۔ اس کے لیے توانائی خارج ہونے کے بجائے درکار ہو گی، اسی لیے O^{3-} آئن نہیں بنتا۔